

ABSTRAK

Proses kehamilan merupakan proses yang normal dan alamiah yang dialami oleh seorang wanita, namun pada kenyataannya banyak yang mengalami komplikasi dalam kehamilan diantaranya preeklamsi yang lebih banyak terjadi pada ibu multigravida dan grandemultigravida. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara paritas dengan kejadian preeklamsi pada ibu hamil trimester III di Puskesmas Sidotopo Wetan.

Desain penelitian ini adalah analitik observasional. Populasi dalam penelitian ini adalah semua ibu hamil trimester III pada bulan Juni di wilayah Puskesmas Sidotopo Wetan Surabaya sebanyak 65 orang. Sampel sebesar 30 responden diambil dengan menggunakan teknik *simple random sampling*. Variabel independen yaitu paritas, variabel dependen yaitu kejadian preeklamsi. Pengumpulan data menggunakan lembar kuisioner dan observasi, pengolahan data melalui *editing, coding* dan *tabulating*. Data dianalisis melalui uji statistika *Mann Whitney* dengan tingkat kemaknaan $\alpha=0,05$.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar (60%) responden tidak mengalami preeklamsi, sebagian besar (60%) adalah multipara. Hasil uji *Mann Whitney* $0,063 > 0,05$ maka H_0 diterima, tidak ada hubungan antara paritas dengan kejadian preeklamsi.

Simpulan dari penelitian ini adalah pada penelitian ini responden tidak hanya pada primigravida tetapi semua ibu hamil trimester III. Petugas kesehatan khususnya bidan lebih meningkatkan lagi upaya pencegahan terhadap kejadian preeklamsi.

Kata Kunci : Paritas, preeklamsi