

ABSTRAK

Mual muntah pada kehamilan merupakan keadaan fisiologis terjadi pada ibu hamil pada trimester 1. Namun masih banyak ibu hamil yang mengalami mual muntah berlebih disertai penurunan nafsu makan. Tujuan penelitian ini mengetahui hubungan antara penggunaan kontrasepsi pil dengan kejadian *hiperemesis gravidarum* di RB. Lilik Sedati Sidoarjo.

Desain penelitian *Analitik*. Populasi semua ibu hamil trimester 1 yang berkunjung di RB. Lilik Sedati Sidoarjo bulan Juni 2015 sebesar 22 orang, besar sampel sebesar 21 responden. Teknik *Simple Random Sampling*, variabel Independen penelitian adalah penggunaan kontrasepsi pil dan variabel Dependen adalah hiperemesis gravidarum. Instrument kuesioner, pengolahan data dengan cara *editing, coding, tabulating* dan dianalisis dengan *Uji Chi Square*, dengan tingkat kemaknaan $\alpha = 0,05$.

Hasil penelitian sebagian besar (72,7%) ibu yang menggunakan kontrasepsi pil mengalami hiperemesis gravidarum. Hasil uji statistik *Exact Fisher* ditemukan nilai signifikansi yaitu 0,008. Nilai signifikan $< \alpha$ maka H_0 ditolak artinya ada hubungan antara penggunaan kontrasepsi pil dengan kejadian hiperemesis gravidarum di RB. Lilik Sedati Sidoarjo.

Simpulan penelitian ini menunjukkan bahwa ada hubungan antara penggunaan kontrasepsi pil dengan kejadian *hiperemesis gravidarum*, diharapkan ibu memilih kontrasepsi lain setelah persalinan.

Kata kunci : penggunaan kontrasepsi pil, *hiperemesis gravidarum*