

ABSTRAK

HUBUNGAN FAKTOR RISIKO DENGAN KEJADIAN GEJALA NEUROTOKSIK PADA PEKERJA DI *HOME INDUSTRY* RAFLY SHOES MOJOKERTO

Pada home industry tersebut didapatkan bahwa pekerja mengalami keluhan seperti mengalami sakit kepala, sesak nafas, mual, dan sering merasa kelelahan. Keluhan-keluhan tersebut termasuk dalam gejala neurotoksik. Paparan zat kimia berbahaya dalam lingkungan kerja yang tidak terkontrol dapat menyebabkan dampak kesehatan serius pada pekerja. Paparan bahan kimia berbahaya dalam lingkungan kerja yang tidak terkontrol dapat menyebabkan efek neurotoksik yang serius pada kesehatan pekerja. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui hubungan faktor risiko dengan kejadian gejala neurotoksik pada pekerja di home industri rafly shoes.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan desain cross sectional. Populasi yang digunakan adalah pekerja di home industry rafly shoes sejumlah 30 responden. Teknik pengambilan sampel menggunakan total sampling. Analisis data menggunakan Uji Chi Square.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 5 responden (17%) mengalami gejala neurotoksik sedangkan 25 responden (83%) tidak mengalami gejala neurotoksik. Berdasarkan hasil uji statistik menunjukkan bahwa terdapat hubungan masa kerja dengan kejadian gejala neurotoksik pada pekerja di Home Industry Rafly Shoes ($P\text{-Value} = 0$, $\Phi = 67,2$) dan ada hubungan konsumsi alkohol dengan kejadian gejala neurotoksik pada pekerja di Home Industry Rafly Shoes ($P\text{-Value} = 0,005$, $\Phi = 0,5$).

Kesimpulan penelitian ini adalah Terdapat hubungan masa kerja dengan kejadian gejala neurotoksik pada pekerja di home industry rafly shoes dan terdapat hubungan antara konsumsi alkohol dengan gejala neurotoksik pada pekerja di home industry rafly shoes.

Kata Kunci : *Neurotoksik, Gejala Neurotoksik, Home Industry.*