

## ABSTRAK

Tingginya kejadian anemia tahun 2010 yaitu 80,7% perempuan usia 10-59 tahun telah mendapatkan tablet Fe, target mengkonsumsi tablet Fe yaitu 92,0% namun hanya 18% diantaranya mengkonsumsi tablet Fe sebanyak 90 tablet. Hasil survey pendahuluan 3 ibu hamil mau mengkonsumsi tablet Fe, 7 ibu hamil tidak mau mengkonsumsi tablet Fe karena merasakan mual muntah setelah minum tablet Fe. Tujuan penelitian menganalisis Hubungan Kemauan dengan Kepatuhan Mengkonsumsi Tablet Fe pada Ibu Hamil Primigravida Trimester I.

Desain penelitian analitik dengan pendekatan cross sectional. Populasi semua ibu hamil primigravida trimester I di Puskesmas Sepulu dengan besar sampel 28 responden, diambil dengan menggunakan teknik simple random sampling. Variabel independen adalah kemauan dan variabel dependen kepatuhan. Instrumen penelitian menggunakan kuesioner, selanjutnya dianalisis menggunakan teknik analisa data menggunakan uji mann-whitney dengan kemaknaan = 0,05.

Hasil penelitian melalui uji mann-whitney didapatkan nilai  $p = 0,001$  sehingga  $p (0,001) < (0,05)$  yang berarti ada hubungan kemauan dengan kepatuhan mengkonsumsi tablet Fe pada ibu hamil primigravida trimester I.

Simpulan penelitian adalah kemauan ibu hamil mengkonsumsi tablet Fe berhubungan dengan kepatuhan, dengan demikian ibu hamil disarankan untuk patuh mengkonsumsi tablet Fe secara rutin.

**Kata kunci : kemauan, kepatuhan, tablet Fe**