

ABSTRAK

Hospital Readmission adalah periode pasien dirawat kembali setelah menerima perawatan sebelumnya di rumah sakit dalam kurun waktu tertentu. masalah yang sering terjadi pada readmisi pasien stroke diantaranya sering mengalami penyakit kronis lainnya seperti diabetes, hipertensi, atau penyakit jantung koroner, kehadiran penyakit penyerta ini dapat meningkatkan risiko readmisi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan Readmisi Pada Pasien Stroke di Ruang VII RSPAL dr. Ramelan Surabaya

Desain penelitian menggunakan kohort retrospektif, teknik pemilihan sampelnya dengan cara total sampling dengan jumlah populasi 100 pasien stroke yang mengalami readmisi. Variabel yang digunakan adalah usia, jenis kelamin dan lama rawat inap dan Perawatan Kembali (Readmisi). Instrumen menggunakan rekam medis. Analisis menggunakan *chi square* dan *korelasi rank spearman*

Hasil penelitian didapatkan Pasien Stroke di Ruang VII RSPAL dr. Ramelan Surabaya hampir seluruhnya (93%) berusia > 45 tahun, jenis kelamin sebagian besar (54%) laki-laki yaitu, hampir setengahnya (45%) lama rawat inap selama 6 – 10 hari, sebagian besar mempunyai riwayat DM / Hipertensi. sebagian besar tidak memiliki komplikasi dan sebagian besar dengan perawatan kembali (readmisi) 30 hari

Simpulan dalam penelitian ini adalah ada hubungan jenis kelamin, lama rawat inap, riwayat DM/Hipertensi dan komplikasi dengan Readmisi Pada Pasien Stroke di Ruang VII RSPAL dr. Ramelan Surabaya. Bagi rumah sakit dapat dijadikan bahan evaluasi untuk pengembangan manajemen pelayanan di Ruang VII dengan cara peningkatan pelayanan pasien tepat.

Kata kunci : jenis kelamin, lama rawat inap, usia, Perawatan Kembali (Readmisi)