ABSTRAK

Adekuasi hemodialisis merupakan salah satu yang mempengaruhi kualitas hidup pasien PGK yang menjalankan tindakan hemodialisis. Adekuasi hemodialisis dapat diukur dengan menggunakan URR dan atau Kt/V. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui menganalisis hubungan adekuasi hemodialisis dan kualitas hidup pasien Penyakit Ginjal Kronik yang menjalankan terapi hemodialisis di RSPAL dr. Ramelan Surabaya

Desain penelitian yang digunakan metode penelitian analitik dengan pendekatan *cross sectional*, sampel penelitian ini adalah pasien PGK yang menjalani terapi hemodialisis di ruang hemodialisa RSPAL dr. Ramelan Surabaya. Sampel ini adalah 67 orang responden dengan menggunakan *purposive sampling* dianalisis dengan menggunakan chi square. Variabel yang digunakan adalah Adekuasi hemodialisis dan Kualitas hidup pasien hemodialisis. Instrumen menggunakan kuesioner menurut WHO.QOL dan lembar observasi.

Hasil penelitian didapatkan adekuasi hemodialisa Pasien PGK di ruang hemodialisa hampir seluruhnya (95,5%) mengalami adekuasi hemodialisa tidak adekuat dan hampir seluruhnya (86,6%) dengan kualitas hidup kurang. Berdasarkan analisis chi square didapatkan nilai p sebesar $p(0,000) < \alpha(0,05)$ hal ini dapat disimpulkan bahwa ada Hubungan Adekuasi Hemodialisis Dengan Kualitas Hidup Pasien yang menjalankan hemodialisis di ruang Hemodialisis RSPAL dr. Ramelan Surabaya.

Semakin adekuat adekuasi hemodialisis, semakin baik pula kualitas hidup pasien yang menjalankan hemodialisis. Sehingga dengan ini diharapkan pasien mampu melakukan aktivitas secara mandiri dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

Kata kunci : Adekuasi hemodialisis, Kualitas Hidup