

## ABSTRAK

Lama persalinan kala II adalah lamanya proses persalinan dimulai pembukaan lengkap sampai bayi lahir. Apabila mengalami perpanjangan kala II, dapat meningkatkan Angka Kematian Ibu (AKI). Berdasarkan data sekunder di TPMB Intan Fitria Ningrum, A.Md. Keb Kabupaten Gresik selama setahun, dari 56 ibu bersalin terdapat 18 ibu (32,2%) mengalami persalinan kala II tidak normal, sebagian besar terjadi pada ibu nulipara sebanyak 13 ibu (59 %). Tujuan penelitian adalah menganalisis hubungan paritas dengan lama persalinan kala II di TPMB Intan Fitria Ningrum, A.Md. Keb Kabupaten Gresik.

Penelitian ini penelitian kuantitatif korelasi dengan pendekatan *cross sectional*. Populasinya ibu bersalin di TPMB Intan Fitria Ningrum sebanyak 56 ibu, dan sampel diambil secara *total sampling*. Variabel independennya paritas, variabel dependennya lama persalinan kala II. Dan menggunakan data skunder kemudian dilakukan tabulasi data dengan uji statistik *Chi-Square* dengan tingkat kemaknaan ( $\alpha < 0,05$ ).

Hasil menunjukkan dari 22 ibu bersalin dengan nulipara sebagian besar (59%) mengalami lama kalaII tidak normal, dari 34 ibu bersalin dengan multipara hampir seluruhnya (85,3%) mengalami kala II normal. Pada proses perhitungan *Chi-Square* dengan program *SPSS* didapatkan  $p$  (0,001) dimana  $< \alpha$  ( 0,05) sehingga  $H_0$  ditolak, berarti ada hubungan paritas dengan lama persalinan kala II. Simpulan penelitian adalah pada ibu bersalin yang sudah pernah melahirkan maka kemungkinan besar akan mengalami kala II normal. Karena itu bidan perlu memberikan HE tentang pentingnya menjaga pola aktivitas, nutrisi dan memotivasi ibu ikut senam hamil agar otot dasar panggul lebih elastis untuk persiapan persalinan.

**Kata kunci : Paritas, Lama, Persalinan, Kala II**