

ABSTRAK

Anemia menjadi penyebab utama terjadinya perdarahan yang merupakan faktor utama kematian ibu melahirkan. Kematian ibu yang disebabkan anemia cukup tinggi yaitu 70%. Di Poli KIA Rumah Sakit Siti Khodijah Jl.Pahlawan no.260 Sepanjang-Sidoarjo ditemukan ibu hamil mengalami anemia dengan jarak kehamilan kurang dari dua tahun. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui hubungan jarak kehamilan dengan kejadian anemia pada ibu hamil di Poli KIA Rumah Sakit Siti Khodijah.

Rancang bangun penelitian ini adalah analitik dengan jenis *Cross Sectional*. Populasi penelitian ini adalah semua ibu hamil kedua yang datang ke Poli KIA Rumah Sakit Siti Khodijah sebanyak 117 responden dan sampel 48 responden yang diambil secara *probability sampling* dengan teknik *simple random sampling*. Data diperoleh dengan menggunakan buku KIA kemudian dengan uji Mann-Whitney.

Hasil uji Mann-Whitney dengan taraf signifikan 0,05 didapat nilai $(0,000) < (0,05)$ maka H_0 ditolak yang artinya ada hubungan jarak kehamilan pada ibu multigravida dengan kejadian anemia di Poli KIA Rumah Sakit Siti Khodijah Jl. Pahlawan.

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah jarak kehamilan pada ibu hamil menyebabkan terjadinya anemia. Oleh karena itu disarankan setiap ibu hamil untuk mengkonsumsi makanan yang bergizi dan vitamin khususnya tablet tambah darah secara teratur serta dapat mengatur jarak kehamilan.

Kata kunci : jarak kehamilan, anemia kehamilan