

## ABSTRAK

Angka kejadian diare yang masih tinggi pada bayi dapat disebabkan karena ibu terlalu dini dalam memberikan MP-ASI sebelum bayi berusia 6 bulan ke atas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan pemberian MP-ASI dini dengan kejadian diare pada bayi di BPS Ari S, Amd.Keb, Candi, sidoarjo.

Desain analitik dengan *cross sectional*. Populasi semua ibu yang memiliki bayi usia 0-6 bulan. Sebesar 30 responden dengan tehnik *total sampling*. Variabel independen pemberian MP-ASI, variabel dependen kejadian diare. Instrumen pengumpulan data menggunakan kuesioner dan analisis data menggunakan uji *Chi-Square* dengan tingkat kemaknaan ( $\alpha = 0,05$ ).

Hasil penelitian menunjukkan responden yang tidak memberikan MP-ASI dini sebagian besar (66,7%). Dan bayi yang mengalami diare setengahnya (50.0%). Hasil uji *Chi-Square* di dapatkan bahwa  $p (0,014)$  dan  $\alpha < (0,05)$ . Hal ini menunjukkan bahwa  $H_0$  di tolak yang artinya ada hubungan pemberian MP-ASI dini dengan kejadian diare pada bayi usia 0-6 bulan di BPS Ari Suprapti,Amd. Keb. Candi, sidoarjo.

Simpulan dari penelitian yaitu semakin dini ibu memberikan MP-ASI maka resiko terjadi diare terhadap bayi semakin tinggi. Memberikan informasi agar tidak memberikan MP-ASI dini kepada bayi usia 0-6 bulan.

Kata Kunci : MP-ASI , Diare