

ABSTRAK

Pemberian MP – ASI memang perlu diberikan akan tetapi harus sesuai dengan usia bayi. Namun masih banyak ibu yang memberikan MP – ASI dini yaitu pemberian tidak sesuai jadwal. Tujuan penelitian mengetahui antara hubungan pemberian MP – ASI dini dengan kejadian obstipasi pada bayi usia 0 – 6 bulan di wilayah kerja BPS Hj. Bashori Surabaya.

Desain penelitian analitik, pendekatan cross sectional. Populasi seluruh ibu yang mempunyai bayi usia 0 – 6 bulan, besar sampel 40 responden. Pengambilan sampel nonprobability sampling dengan teknik total sampling. Variabel independen adalah pemberian MP – ASI dini dan variabel dependen adalah kejadian obstipasi. instrumen menggunakan kuisisioner, analisa data menggunakan uji statistik Kruskall Wallis dengan tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$.

Hasil penelitian dari 40 responden sebagian besar (65%) bayi diberikan MP – ASI dini lumat dan hampir seluruhnya (88,8%) bayi mengalami obstipasi ringan. Hasil uji statistik $p = 0,02$ sehingga nilai $p < \alpha$ sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima yang berarti Ada Hubungan Pemberian MP – ASI Dini Dengan Kejadian Obstipasi Pada Bayi Usia 0 – 6 Bulan.

Simpulan penelitian ada ada hubungan pemberian mp – asi dini dengan kejadian obstipasi pada bayi usia 0 – 6 bulan. Bidan diharapkan dapat memberikan informasi melalui penyuluhan tentang MP – ASI sesuai usia dengan melibatkan masyarakat.

Kata kunci : MP – ASI dini, obstipasi pada bayi