

## ABSTRAK

Ibu hamil masih banyak mengalami KEK. Kejadian KEK ini bisa di observasi dengan pengukuran LILA. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran status gizi ibu hamil berdasarkan Lingkar Lengan Atas di BPS Kusmawati Surabaya.

Desain penelitian ini menggunakan deskriptif. Populasi yaitu semua ibu hamil yang memeriksakan kehamilannya di BPS Kusmawati sebanyak 34 ibu hamil. Pengambilan sampel secara *non probability* sampling dengan teknik *total ampling* sebesar 34 responden. Variabel adalah status gizi ibu hamil. Instrumen menggunakan pita pengukur lingkar lengan atas. Data dianalisis menggunakan statistik deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan berdasarkan Lingkar Lengan Atas hampir setengahnya (44,1%) responden mempunyai status gizi kurang, hampir setengahnya (38,3%) responden mempunyai status gizi baik dan sebagian kecil (17,6%) responden mempunyai status gizi lebih

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat di simpulkan bahwa status gizi ibu hamil berdasarkan lingkar lengan atas hampir setengahnya responden memiliki status gizi kurang. Diharapkan petugas kesehatan dapat meningkatkan penyuluhan pentingnya mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang selama kehamilan.

Kata Kunci : status gizi, ibu hamil