

ABSTRAK

Penularan penyakit TBC melalui udara yang tercemar oleh bakteri *mikrobakterium tuberculosis*. TBC dapat menimbulkan kecemasan keluarga. Tujuan penelitian adalah mengidentifikasi adanya tingkat kecemasan keluarga pada penularan TB Paru di Rumah Sakit Paru Karang Tembok Surabaya.

Desain penelitian adalah deskriptif. Populasi penelitian ini adalah keluarga penderita TB Paru berjumlah 30 keluarga. Besar sampel 30 responden. Sampel adalah keluarga penderita TB Paru yang mengalami kecemasan. Teknik pengambilan dengan sampel *total sampling*. Variabel adalah tingkat kecemasan keluarga pada penularan TB Paru.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kecemasan pada penularan TB Paru sebagian besar responden 56.70% yaitu ringan.

Simpulan dari penelitian ini adalah tingkat kecemasan keluarga pada penularan TB Paru di RS Paru Surabaya sebagian besar yaitu ringan karena dalam keluarga pernah ada yang mengalami penyakit yang sama. Sehingga keluarga sudah mengetahui tentang penyakit TBC dan penularannya meskipun mereka belum mengetahui secara pasti tentang penularan TBC. Petugas kesehatan dapat memberikan informasi pada keluarga penderita TB Paru agar keluarga tidak merasa cemas dalam menangani anggota keluarga yang terkena penyakit TBC.

Kata kunci : Tingkat kecemasan.