

ABSTRAK

Salah satu penyebab terjadinya peningkatan seksio caesarea karena permintaan ibu yang tidak ingin menjalani persalinan normal dengan adanya rasa takut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang faktor – faktor yang mempengaruhi persalinan secara seksio caesarea pada primigravida di RS Bhakti Rahayu Surabaya.

Desain penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah semua primigravida dengan pertolongan persalinan secara seksio caesarea di RS Bhakti Rahayu Surabaya sejumlah 279 orang. Besar sampel sebanyak 279 responden, diambil secara *total sampling*. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan buku register di ruang VK RS Bhakti Rahayu Surabaya bulan Januari sampai April 2011. Penelitian dilaksanakan pada bulan Agustus 2011. Kemudian data yang diperoleh diolah dengan menggunakan teknik Coding dan Tabulasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor – faktor yang mempengaruhi persalinan secara seksio caesarea pada primigravida di RS Bhakti Rahayu Surabaya adalah 27,6% ketuban pecah dini, 11,8% letak sungsang, 11,1% *cephalopelvic disproportion*, 10,4% preeklampsia ringan, 9,7% preeklampsia berat, 9,3% kala II lama, 8,2% atas permintaan sendiri, 4,7% plasenta previa, sedang sisanya 7,2% faktor yang lain.

Berdasarkan hasil penelitian, diambil kesimpulan bahwa faktor terbanyak dilakukan operasi caesar akibat ketuban pecah dini. Untuk mengurangi tingginya angka kejadian ketuban pecah dini dan faktor – faktor tersebut terjadi, maka tugas bidan menghimbau kepada ibu hamil agar segera memeriksakan dirinya ke bidan untuk deteksi dini adanya komplikasi. Dan melakukan rujukan jika ditemukan adanya komplikasi.

Kata kunci : primigravida, seksio caesarea, faktor