

## ABSTRAK

ASI bermanfaat untuk pertumbuhan otak, hormon, dan fisik bayi. Cakupan ibu menyusui ASI eksklusif di wilayah kerja Puskesmas Wonokromo Surabaya sebesar 58%. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan faktor penyebab kegagalan pemberian ASI eksklusif di wilayah Puskesmas Wonokromo Surabaya.

Desain penelitian adalah deskriptif. Populasi adalah semua ibu yang mempunyai bayi usia 0-6 bulan yang tidak menyusui secara eksklusif di wilayah kerja Puskesmas Wonokromo Surabaya sebesar 44 orang. Sampel sebesar 40 orang diambil menggunakan teknik *nonprobability sampling* dengan jenis *purposive sampling*. Data diperoleh dengan cara wawancara langsung, pengolahan data dengan *editing*, *coding* dan tabulasi.

Hasil penelitian didapatkan faktor ibu yaitu, kondisi payudara ibu sebesar 22,5%, pengetahuan sebesar 20%, ibu bekerja 12,5%, sosial budaya 5%, ASI tidak cukup sebesar 35%. Sedangkan faktor bayi yaitu, bayi lahir rendah 2,5%, dan bayi yang menderita sakit 2,5%.

Simpulan dari penelitian faktor penyebab kegagalan pemberian ASI eksklusif yaitu faktor ibu karena ASI tidak cukup. Diharapkan petugas Puskesmas Wonokromo Surabaya lebih aktif memberikan penyuluhan tentang ASI agar pemberian ASI eksklusif di wilayah kerja Puskesmas Wonokromo Surabaya berhasil.

Kata kunci : ASI eksklusif