

ABSTRAK

Wanita yang sebelumnya tidak pernah mengalami masalah *konstipasi*, bisa mengalami masalah tersebut selama kehamilannya. *Konstipasi* memiliki potensi terbentuknya *haemorroid*. Semakin sering *konstipasi* dialami maka semakin sering terjadi penekanan pada usus bagian bawah yang menyebabkan terjadinya *haemorroid*.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara *konstipasi* kehamilan dengan adanya *haemorroid* saat persalinan.

Penelitian ini menggunakan desain analitik *cross sectional*. Populasi dalam penelitian ini adalah ibu bersalin sejumlah 50 orang. Adapun besar sampel diperoleh dari 44 teSpOD.den yang memenuhi kriteria penelitian, kemudian sampel diambil dengan teknik *simple random sampling*. Data dikumpulkan dengan cara menggunakan observasi dan pedoman wawancara. Setelah data dikumpulkan maka data dianalisa menggunakan uji *chi-square* dengan taraf signifikan $\alpha = 0,05$.

Dari penelitian yang telah dilakukan dapat diidentifikasi adanya *konstipasi* kehamilan dan adanya *haemorroid* saat persalinan, kemudian basil tersebut di uji dengan uji *chi-square* didapatkan χ^2 hitung (9,544) > χ^2 tabel (5,99) maka H_1 diterima yang berarti ada hubungan *konstipasi* kehamilan dengan adanya *haemorroid* saat persalinan di RB Ny. Soegiarti Surabaya.

Dari hasil penelitian didapatkan bahwa *konstipasi* kehamilan dapat mempengaruhi terbentuknya *haemorroid*, oleh karena itu sebaiknya tenaga kesehatan terutama bidan perlu meningkatkan upaya preventif antenatal care ibu hamil sehingga dapat meminimalkan *konstipasi* kehamilan dan mencegah adanya *haemorroid* saat persalinan.

Kata kunci : *Konstipasi* kehamilan, *Haemorroid* persalinan.