

## ABSTRAK

Kembung adalah gangguan pada perut yang terjadi karena terlalu banyak udara masuk ke dalam pencernaan. Kembung sering dialami oleh bayi yang salah satu penyebabnya adalah pemberian makanan pendamping ASI yang terlalu dini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui " Hubungan Antara Pemberian Makanan Pendamping ASI Dengan Kejadian Kembung Pada Bayi Usia 0 - 6 Bulan Di Desa Pegundan Bungah Gresik" pada tanggal 09 Juni — 04 Juli 2008.

Desain yang digunakan adalah analitik dengan pendekatan *Case - Control Study* yang bersifat *retrospektif*, data di peroleh dengan observasi langsung pemeriksaan fisik pada bayi usia 0 - 6 bulan serta menggunakan kuesioner dengan populasi semua ibu yang mempunyai bayi usia 0 - 6 bulan di Desa Pegundan Bungah Gresik pada tanggal 09 Juni - 04 Juni 2008 yang berjumlah 35 orang. Besar sampel yaitu 32 responden yang memenuhi kriteria penelitian. Sampling yang digunakan adalah *simple random sampling*.

kemudian untuk mengetahui hubungan antara pemberian makanan pendamping ASI dengan kejadian kembung pada bayi usia 0 - 6 bulan digunakan uji statistik *Chi-Square* dari Yates dengan :  $\alpha$  5% , df: 1 maka didapat  $\chi^2_{hitung}$  : 8,54 >  $\chi^2_{tabel}$ : 3,84 jadi ada hubungan antara pemberian makanan pendamping ASI dengan kejadian kembung pada bayi usia 0 - 6 bulan di Desa Pegundan Bungah Gresik.

Kesimpulan dari penelitian ini didapatkan hubungan antara pemberian makanan pendamping ASI dengan kejadian kembung pada bayi usia 0 - 6 bulan di Desa Pegundan Bungah Gresik. Oleh karena itu, diharapkan ibu tidak memberikan makanan pendamping ASI terlalu dini dan mengetahui cara menyendawakan bayi setelah bayi menyusui.

Kata kunci : Pemberian makanan pendamping ASI, kejadian kembung pada bayi usia 0 - 6 bulan.