

ABSTRAK

Kehamilan letak lintang merupakan kehamilan dengan kelainan letak yang dapat disebabkan banyak hal. Penyebab utama letak lintang ialah multiparitas. Banyak terjadi pada multiparitas dikarenakan oleh uterusnya mengalami kelonggaran.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui adakah hubungan antara paritas dengan kehamilan letak lintang di Rumah Sakit Islam A. Yani Surabaya.

Penelitian ini merupakan penelitian analitik dengan menggunakan pendekatan *cross sectional*. Populasi yang diambil ialah seluruh ibu hamil dengan usia kehamilan ≥ 28 minggu yang periksa di Poli Hamil RSI A. Yani Surabaya sebesar 84 responden. Besar sampel dalam penelitian ini sebesar 69 responden. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *simple random sampling*. Variabel independen paritas dan variabel dependen kehamilan letak lintang. Instrumen yang digunakan ialah Checklist. Uji statistik yang digunakan adalah uji statistik *Chi Square* dengan derajat kemaknaan (α) 0,05.

Dari hasil uji statistik *Chi Square* didapatkan $P (0,028) < \alpha (0,05)$ dengan demikian H_0 ditolak yang artinya ada hubungan antara paritas dengan kehamilan letak lintang di Poli Hamil Surabaya.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ibu hamil yang mempunyai paritas tinggi cenderung terjadi kelainan letak. Oleh karenanya ibu hamil harus sering kontrol supaya dapat dilakukan deteksi secara dini kelainan letak dan dapat cepat ditangani.

Kata kunci : paritas, kehamilan letak lintang

