

## RINGKASAN

Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi merupakan salah satu indikator derajat kesehatan masyarakat. Pada tahun 2016 di wilayah Surabaya AKI sebesar 78,55 per 100.000 kelahiran hidup dan AKB sebesar 6,39 per 100.000 kelahiran hidup (Kemenkes RI, 2016) Penyebab langsung dari AKI di Indonesia seperti halnya negara lain adalah, perdarahan, tekanan darah tinggi saat hamil (eklamsi), infeksi, persalinan macet dan komplikasi keguguran. Sedangkan penyebab langsung kematian pada bayi adalah Bayi Baru Lahir Rendah (BBLR) dan kekurangan oksigen (asfiksia). Tujuan laporan tugas akhir ini untuk memebrikan asuhan kebidanan yang bersifat komprehensif dan berkelanjutan (*Contuinity Of Care*).

Asuhan *Continuity of Care* dilakukan mulai dari kehamilan trimester III (1x), bersalin (1x), masa nifas (4x), bayi baru lahir (4x) dan keluarga berencana (2x) dengan menggunakan standar asuhan kebidanan yang diberikan di RB BPM Sri Umi dimulai dari tanggal 11 Maret 2018 sampai 13 Mei 2018.

Asuhan kebidanan diberikan pada Ny. D G<sub>3</sub>P<sub>2002</sub> UK 38 minggu pada tanggal 11 Maret 2018 ibu mengeluh sering BAK. Pada kunjungan 1-3 didapatkan hasil dalam batas normal. Proses persalinan berlangsung normal, bayi lahir tanggal 19 Maret 2018 pukul 08.00 WIB berjenis kelamin perempuan. Kunjungan nifas 1-4 didapatkan hasil dalam batas normal. Asuhan bayi baru lahir berjalan fisiologis namun pada kunjungan ke 4 bayi mengalami miliriasis. Kunjungan pertama KB ibu diberikan konseling keluarga berencana dan berencana menggunakan KB suntik 3 bulan, pada minggu ke-5 postpartum ibu sudah menggunakan KB suntik 3bulan.

Berdasarkan asuhan kebidanan *Continuity of Care* diberikan pada Ny.D mulai hamil sampai keluarga berencana diharapkan klien dapat menerapkan konseling yang telah diberikan selama dilakukan asuhan kebidanan sehingga kondisi ibu dan bayi tetap sehat serta mencegah terjadinya komplikasi hingga kematian.