

ABSTRAK

Masa nifas adalah masa sesudah persalinan dan kelahiran bayi, plasenta, serta selaput yang diperlukan untuk memulihkan kembali organ kandungan seperti sebelum hamil dengan waktu kurang lebih 6 minggu. Masalah yang sering dijumpai pada masa nifas adalah ASI tidak keluar sedangkan intervensi yang berfokus pada stimulasi hormon oksitosin masih jarang dilakukan misalnya pijat oksitosin. Penerapan ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pijat oksitosin pada pasien post sectio caesarea dengan masalah keperawatan ketidakefektifan pemberian ASI Di Ruang Mawar Rumah Sakit Islam Jemursari Surabaya.

Desain penulisan yang digunakan adalah deskriptif dengan metode studi kasus. Subjeknya adalah pasien post Sectio Caesarea dengan masalah keperawatan ketidakefektifan pemberian ASI yang diberikan asuhan keperawatan dengan pendekatan proses keperawatan selama 3 hari.

Hasil penerapan asuhan keperawatan pijat oksitosin dalam 6x tindakan selama 3 hari berturut-turut pada pasien post Sectio Caesarea didapatkan keberhasilan menyusui tercapai dengan kriteria hasil ASI dapat keluar dengan lancar ditambah adanya dukungan dari keluarga.

Simpulan dari studi kasus ini bahwa adanya pengaruh pijat oksitosin terhadap pengeluaran ASI. Oleh karena itu, Diharapkan perlu adanya terapi komplementer untuk meningkatkan produksi ASI dengan pijat oksitosin pada ibu nifas yang mempunyai masalah keperawatan ketidakefektifan pemberian ASI.

Kata kunci : Pijat oksitosin, *Post Sectio Caesarea*