

ABSTRAK

Perdarahan post partum merupakan penyebab penting kematian maternal yang terjadi setelah bayi lahir. Dengan melaksanakan *Antenatal Care* secara teratur, maka kehamilan resiko tinggi dapat dipantau. Perdarahan post partum dipengaruhi beberapa faktor salah satunya adalah paritas.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat adakah hubungan antara paritas dengan perdarahan post partum di RSUD Dr.M.Soewandie-Surabaya.

Desain penelitian ini menggunakan metode penelitian survey analitik, dengan tipe *case control*, populasi dalam penelitian ini semua ibu yang bersalin di RSUD Dr.M.Soewandhie-Surabaya sebanyak 507 responden, besar sampel penelitian sebagian ibu yang bersalin normal pervaginam sebanyak 224 responden ibu bersalin di RSUD Dr.M.Soewandie-Surabaya. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan tehnik *probability sampling* dengan cara *simple random sampling*. Variabel dalam penelitian yaitu paritas sebagai variabel independent dan perdarahan post partum sebagai variabel dependent. Data dikumpulkan dengan melihat rekam medik dengan menggunakan instrument check list dan disajikan dalam bentuk tabel frekuensi, tabulasi silang dan uji *Chi-Square* dengan $\alpha = 0.05$

Dari tabel uji korelasi *Chi-Square* didapatkan χ^2 hitung (1, 36) > χ^2 tabel (3, 84) yang berarti tidak ada hubungan antara paritas dengan perdarahan post partum pada ibu bersalin di RSUD Dr.M.Soewandie-Surabaya.

Berdasarkan penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa paritas bukan salah satu faktor yang menyebabkan perdarahan post partum yang terjadi di RSUD Dr.M.Soewandhie-Surabaya, sehingga lebih meningkatkan kembali pelayanan yang diberikan kepada masyarakat khususnya pelayanan dalam bidang kebidanan.

Kata Kunci : Paritas, perdarahan post partum

YAYASAN RS ISLAM SURABAYA