

ABSTRAK

Frekuensi kejadian seksio sesarea bertambah pesat selama dua dekade terakhir, baik di Amerika maupun di negara-negara berkembang lainnya. Hal ini disebabkan oleh berkembangnya indikasi dan kemajuan teknik operasi, padahal resiko morbiditas dan mortalitas terbukti 4-6 kali lipat lebih besar dari kelahiran pervaginam salah satu faktor yang menyebabkan kejadian seksio sesarea adalah *post date*.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisa hubungan antara *post date* dengan kejadian seksio sesarea di Rumah Sakit Islam Surabaya.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian analitik dengan pendekatan *cross sectional*. Besar sampel 162 responden yang diambil dengan *simple random sampling* dari seluruh ibu bersalin di rumah Sakit Islam Surabaya mulai bulan Januari sampai Mei 2006 sebanyak 272 responden. Instrumen pengumpulan data menggunakan check list. Variabel yang diteliti adalah *post date* sebagai variabel independen, seksio sesarea sebagai variabel dependen. Selanjutnya disajikan dan dianalisa dengan uji *chi-square*, karena tidak memenuhi syarat maka dilanjutkan dengan uji *eksak fisher*.

Dari hasil analisa uji *eksak fisher* didapatkan hasil $P = 0,595$ dengan angka kemaknaan $\alpha = 0,05$ berarti $P > \alpha$ dengan demikian H_0 diterima. Artinya tidak ada hubungan antara *post date* dengan kejadian seksio sesarea.

Kesimpulannya bahwa ibu bersalin yang secara seksio sesarea lebih banyak atas indikasi lain selain *post date*. Hal ini dipengaruhi oleh. Faktor yang lain seperti kasus rujukan, indikasi absolut, permintaan pribadi, kelainan letak dan indikasi lainnya. Seharusnya keputusan kelahiran seksio sesarea diambil jika keuntungannya lebih banyak daripada kerugiannya dibandingkan persalinan pervaginam yang berorientasi pada keselamatan ibu dan bayi.

Kata kunci : *post date*, seksio sesarea

YAYASAN RS ISLAM SURABAYA

P ERPUSTAKAAN
STIKES YAYASAN RS. ISLAM SURABAYA