

ABSTRAK

Angka kejadian kehamilan letak sungsang sebesar 2-3 % bervariasi diberbagai tempat, sekalipun kejadian Letak Sungsang kecil tetapi mempunyai penyulit yang besar dengan angka kematian bagi bayi 20-30 % (Manuaba,2001). Salah satu penyebab dari kehamilan Letak Sungsang adalah paritas yang tinggi (Multiparitas).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara paritas dengan kehamilan letak sungsang di BKIA Rumah Sakit Islam Surabaya.

Desain penelitian yang digunakan adalah analitik dengan pendekatan Cross Sectional Polpulasi diambil dari seluruh ibu hamil yang periksa di BKIA RSI Surabaya bulan Januari sampai dengan Maret 2006 dengan usia kehamilan 28 minggu atau lebih. Data yang dikumpulkan dengan menggunakan data sekunder yang diambil dari buku register ibu hamil. Besar sampel 82 responden. Sampling yang digunakan simple random sampling dan menggunakan uji statistik Chi-Square.

Hasil uji statistik dengan Chi-Square χ^2 hitung 5,47 dan χ^2 tabel 3,84 menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima berarti ada hubungan antara paritas dengan kehamilan letak sungsang.

Dari hasil tersebut penelitian dapat disimpulkan bahwa paritas tinggi (Multiparitas) mempunyai resiko untuk mengalami kehamilan letak sungsang lebih besar daripada primiparitas. Oleh karena itu, saran yang diberikan adalah melakukan ANC secara teratur bagi para ibu hamil.

Kata Kunci : Paritas, Letak Sungsang



PERPUSTAKAAN
STIKES YAYASAN RS ISLAM SURABAYA
YAYASAN RS ISLAM SURABAYA