

ABSTRAK

Thypoid merupakan penyakit yang salah satunya diakibatkan karena pengaturan menu makanan yang kurang memenuhi syarat kesehatan. Sebagian besar penderita ini adalah anak-anak dan orang dewasa (umur 12 tahun keatas) pada kenyataannya banyak orang dewasa (umur 12 tahun keatas) diruang C2 Rumah Sakit Islam Jemursari Surabaya, Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti mengadakan penelitian tentang hubungan menu makanan dengan usia remaja pada pasien thypoid diruang C2 Rumah Sakit Islam Jemursari Surabaya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui adakah hubungan menu makanan dengan usia remaja pada pasien thypoid diruang C2 Rumah Sakit Islam Jemursari Surabaya.

Jenis penelitian ini adalah *analitik* dengan *case control*. Dengan jumlah populasi sebanyak 23 orang dengan besar sampel 23 orang, yang diambil secara *total sampling* sesuai kriteria penelitian. Data diperoleh dari kuesioner, dianalisis dengan menggunakan uji *chi square* dengan tingkat kemaknaan $\alpha = 0,05$.

Hasil uji *chi square* didapatkan hasil, χ^2 hitung = 6,244 > χ^2 tabel (df=2) : 5,991 berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima atau ada hubungan antara menu makanan dengan usia remaja pada pasien thypoid diruang C2 Rumah Sakit Islam Jemursari Surabaya.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa semakin tidak terpenuhinya variasi menu makanan, semakin tinggi tingkat kejadian thypoid pada remaja.

Kata Kunci : menu makanan, usia.


PERPUSTAKAAN
STIKES YAYASAN RS. ISLAM SURABAYA