

ABSTRAK

Persiapan laktasi selama masa kehamilan dapat dilakukan dengan ANC (Antenatal Care) atau pemeriksaan kehamilan. Faktor-faktor yang mempengaruhi persiapan laktasi pada ibu primigravida trimester III antara lain keteraturan ANC, pengetahuan ibu tentang manfaat menyusui, perawatan payudara selama hamil, dan kebiasaan menyusui dilingkungan keluarga bayi, yang mendapatkan ASI Eksklusif meningkat sebanyak 47,42% di Jawa Timur tahun 2003. Di BPS Ny.E Pademawu pamekasan masih terdapat ibu primigravida Trimester III yang melakukan antenatal care teratur(baik) dan persiapan laktasinya baik.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa hubungan antara ANC pada primigravida trimester III dengan persiapan laktasi.

Desain penelitian ini bersifat analitik dilakukan secara cross sectional. Populasi diambil dari seluruh ibu primigravida trimester III yang melakukan ANC di BPS Ny.E di Pademawu Pamekasan dan sampelnya adalah responden yang memenuhi kriteria inklusi yaitu sebanyak 46 responden. Pemilihan sampel dengan *simple random sampling* yang menggunakan metode pengambilan data melalui kuesioner dan status bumil kemudian dilakukan dengan uji *chi square*.

Bedasarkan analisa data yang dilakukan dengan menggunakan uji Chi square test didapatkan χ^2 hitung = 3,9 > χ^2 tabel 3,84 sehingga H_0 ditolak H_1 diterima maka ada hubungan antara ANC pada primigravida trimester III dengan persiapan laktasi.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ANC ditingkatkan terutama pada persiapan laktasi, karena persiapan laktasi yang baik dapat bermanfaat bagi bayi untuk mencegah penyakit dan memberikan kekebalan pada tubuh bayi.

Kata kunci : ANC, persiapan laktasi

YAYASAN RS ISLAM SURABAYA