

## ABSTRAK

AKI dan AKB di Indonesia tergolong tinggi karena sebagian besar terlambat mengambil keputusan, terlambat sampai ditempat rujukan, dan terlambat mendapatkan penanganan, hal itu menjadi faktor utama peningkatan AKI dan AKB di Indonesia. Tujuan penulisan LTA ini adalah untuk memberikan asuhan *continuity of care* pada ibu hamil, bersalin, nifas, BBL, dan KB menggunakan manajemen asuhan kebidanan sehingga menekan penurunan AKI dan AKB.

Metode pendekatan studi kasus yang dilakukan secara komprehensif (*continuity of care*) dilakukan penulis di PKM Sedati. Dengan subyek penelitian NY. W yang dilakukan mulai dari ibu hamil trimester III, bersalin, nifas, bayi baru lahir, KB kemudian didokumentasikan.

Pada kunjungan hamil berjalan fisiologis. Pada tanggal 10 Mei 2020 jam 08.30 WIB ibu melahirkan, normal, BB 3000gr, PB 50cm. Pada kunjungan nifas berjalan fisiologis, involusi, penyembuhan luka jahitan, dan laktasi berlangsung baik. Pada kunjungan BBL leukosit bayi meningkat, dilakukan perawatan oleh dokter. Pada kunjungan KB klien memilih KB suntik 3 bulan.

Berdasarkan hasil asuhan kebidanan yang dilakukan pada Ny. W didapatkan hasil pemeriksaan, penyulit pada saat persalinan, kala I memanjang, dan ketuban keruh, bayi yang leukositnya meningkat akibat ketuban keruh. Diharapkan klien dan keluarga menerapkan HE yang diberikan sehingga kondisi ibu dan bayi tetap sehat serta mencegah terjadinya komplikasi hingga kematian.