

## ABSTRAK

Pemberian MP-ASI harus di lakukan secara bertahap sesuai dengan pencernaan bayi. Pencernaan makanan selain ASI dalam saluran cerna bayi 0-6 bulan masih belum sempurna. Pemberian MP-ASI terlalu dini akan mengakibatkan kemampuan pencernaan bayi belum siap menerima makanan tambahan. Hal ini akan berdampak terhadap kejadian infeksi yang tinggi seperti diare, infeksi saluran napas, hingga gangguan pertumbuhan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Hubungan Pemberian MP-ASI Dini dengan Kejadian Diare Pada Bayi Usia 0-6 Bulan.

Desain dalam penelitian ini adalah analitik observasional dengan metode *cross sectional*. Populasi dalam penelitian ini yaitu ibu yang memiliki bayi usia 0-6 bulan di Posyandu Sedap Malam Tengger Kandangan Timur Surabaya sebesar 50 orang. Besar sampel 45 orang diambil dengan menggunakan teknik *probability sampling*, dengan metode *simple random sampling*. Analisa data menggunakan uji *Chisquare*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hampir seluruhnya responden (91,1%) memberikan MP-ASI dini. Dan dari 41 responden yang memberikan MP-ASI dini sebagian besar terjadi diare (68,3%). 4 responden yang tidak memberikan MP-ASI dini tidak terjadi diare. Berdasarkan uji statistik yang didapatkan nilai kemaknaan  $\alpha = 0,05$  didapatkan nilai *p-value* = 0,016 berarti *p-value* <  $\alpha$  maka  $H_0$  ditolak artinya ada hubungan pemberian MP-ASI Dini dengan Kejadian Diare Pada Bayi Usia 0-6 Bulan di Posyandu Sedap Malam Tengger Kandangan Timur Surabaya.

Pemberian MP-ASI dini memiliki hubungan yang signifikan dengan kejadian diare. Dengan demikian diharapkan pelayanan kesehatan agar lebih memberikan *Health Education* kepada masyarakat khususnya ibu tentang manfaat ASI eksklusif serta dampak yang akan timbul jika diberikan MP-ASI Dini sehingga bayi tidak mengalami diare.

**Kata kunci :** Pemberian MP-ASI dini, Diare.