

ABSTRAK

Isolasi sosial : menarik diri merupakan salah satu gejala skizofrenia yang sering ditemukan pada klien dengan gangguan jiwa isolasi sosial : menarik diri tergolong skizofrenia, dimana klien sering menyendiri , melamun, tidak ada kontak segera diatas maka dapat menyebabkan harga diri rendah. Halusinasi, mencederai diri dan orang lain. Tujuan penelitian untuk mengetahui penerapan inovasi terapi *Skill Social Training (SST)* dengan masalah keperawatan isolasi sosial : menarik diri diruang Kenaei RSJ Menur Surabaya.

Desain penelitian menggunakan studi kasus penelitian Tn.Y dengan diagnosa medis skizofrenia dengan masalah keperawatan pada isolasi sosial menarik diri . metode pengumpulan dengan cara observasi, wawancara dan pemeriksaab fisik.

Penerapan terapi *Social Skill Training (SST)* ini dilakukan selama kurang lebih 30-40 menit setiap hari. Klien isloasi sosial ; menarik diri diberikan kepada hari ke tiga pada pertemuan ketiga mau berkomunikasi dengan yang lain

Hasil penelitian menunjukkan penerapan terapi *Social Skill Training (SST)* efektif yang digunakan pasien yang kesulitan berinteraksi dengan orang lain. Penerapan ini semakin sering dilakukan untuk klien dengn isolasi sosial : menarik diri maka sangat. Sehingga diharapkan dapat memberikan intervensi mengajarkan terapi ini pada klie dengan isolasi sosial.

Kata Kunci: Isolasi Sosial ; Menarik Diri, *Scocial Skill Training (SST)*