

ABSTRAK

Hemodialisis merupakan salah satu terapi pada penatalaksanaan pasien dengan gagal ginjal namun pada perkembangannya tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya dan cenderung memengaruhi perburukan keadaan pasien yang salah satunya adalah peningkatan berat badan interdialitik atau *interdialytic weight gain* (IDWG). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan dukungan keluarga dengan peningkatan berat badan diantara dialysis (*interdialytic weight gain*) pada pasien gagal ginjal kronik yang menjalani hemodialisis

Desain penelitian ini menggunakan korelasi dengan pendekatan *cross sectional*. Populasi pada penelitian ini adalah pasien gagal ginjal kronik yang menjalani hemodialisis dengan sampel sebanyak 60 responden. Teknik pengambilan sampel menggunakan *Purposive sampling*. Alat pengumpul data adalah kuesioner *family support scale* (FSS). Analisis data menggunakan *uji spearman rho*

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar dukungan keluarga adalah cukup (70%) dan berat badan diantara dialysis (*interdialytic weight gain*) pada pasien hemodialisis sebagian besar berada pada tingkat sedang (76,7%). Hasil statistik menunjukkan ada hubungan antara dukungan keluarga dengan peningkatan berat badan diantara dialysis (*interdialytic weight gain*) pada pasien gagal ginjal kronik yang menjalani hemodialisis ($p\ value = 0,001$; $r = -0,589$)

Studi ini menunjukkan bahwa dukungan keluarga yang baik akan menurunkan berat badan interdialitik sehingga, mendorong keluarga untuk terus memberikan dukungan kepada para penderita yang menjalani dialysis sehingga patuh terhadap seluruh rejimen terapi.

Kata Kunci: Dukungan Keluarga, Peningkatan Berat Badan, Diantara Dialysis