

## RINGKASAN

Data menunjukkan AKI dan AKB pada tahun 2019 di Jawa Timur adalah AKI 89,92 per 100.000 KH untuk AKB 23 per 1.000 KH. Berdasarkan penyebab, sebagian besar kematian ibu pada tahun 2020 disebabkan oleh perdarahan, hipertensi dalam kehamilan, dan gangguan sistem peredaran darah. Penyebab kematian neonatal terbanyak adalah kondisi berat badan lahir rendah (BBLR). Penyebab kematian lainnya di antaranya asfiksia, infeksi, kelainan kongenital, tetanus neonatorium. Tujuan dari laporan Tugas Akhir ini adalah melakukan asuhan *continuity of care* pada ibu hamil, bersalin, nifas, neonatus, dan KB dengan pendekatan manajemen kebidanan.

Metode pendekatan studi kasus yang dilakukan secara komprehensif (*Contuinity of Care*) di lakukan penulis di Klinik Cita Sehat Surabaya mulai tanggal 18 Mei-19 Juli 2022 dengan subjek penelitian Ny.A G1P0000 yang dilakukan mulai dari ibu hamil trimester III, bersalin, nifas, bayi baru lahir, KB kemudian data dikumpulkan menggunakan data primer dan sekunder.

Berdasarkan hasil asuhan kebidanan *Contuinity of Care* yang telah dilakukan pada Ny. A didapatkan hasil kunjungan sebanyak 14 kali dengan rincian 3 kali kunjungan kehamilan, 1 kali kunjungan persalinan, 4 kali kunjungan nifas, 4 kali kunjungan neonatus, dan 2 kali kunjungan KB. Secara keseluruhan hasil pemeriksaan dalam batas normal dan fisiologis.

Simpulan dari asuhan kebidanan secara komprehensif pada Ny A berlangsung secara fisiologis. Diharapkan klien dapat menerapkan HE yang telah diberikan selama dilakukan asuhan kebidanan sehingga kondisi ibu dan bayi tetap sehat serta mencegah terjadinya komplikasi hingga kematian.

Kata kunci : AKI dan AKB, *Continuity Of Care*, Fisiologis