

RINGKASAN

Angka kematian ibu di Jawa Timur tahun 2019 AKI kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup dan AKB menjadi 12 per 1000 kelahiran hidup. Faktor penyebab kematian ibu adalah BBLR, asfiksia sepsis dan kelainan bawaan yang mempengaruhi AKI.

Asuhan kebidanan ini dilakukan dengan pendekatan studi kasus yang dilakukan secara *Continuity of care* di Puskesmas Dupak Surabaya tangga 24 Mei 2022 sampai 21 Juli 2022 pada Ny. W dan bayinya, pendampingan dilakukan secara offline mulai dari hamil sampai KB sebanyak 13 kali dengan rincian hamil 2 kali, persalinan 1 kali, nifas 4 kali, BBL 4 kali, KB 2 kali.

Pada kujungan hamil berjalan fisiologis dengan hasil pemeriksaan dalam batas normal, persalinan berjalan fisiologis, masa nifas berjalan fisiologis, BBL berjalan fisiologis dan alat kontrsepsi yang dipilih ibu adalah kondom.

Asuhan kebidanan *Continuity of care* yang telah dilakukan pada Ny.W didapatkan hasil yang normal. Diharapkan klien dapat menerapkan KIE yang telah diberikan selama dilakukan asuhan kebidanan, sehingga kondisi ibu dan bayi tetap sehat serta mencegah terjadinya komplikasi hingga kematian.